

# ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



НМИЦ АГП  
им. В.И. Кулакова

## COVID-19 при беременности

- Симптомы простуды могут отсутствовать или быть слабо выраженным, поэтому при появлении симптомов простуды необходимо обратиться к врачу
- Повышается риск попадания в отделения реанимации и интенсивной терапии, применения искусственной вентиляции легких
- Повышается риск преждевременных родов
- Повышается риск гибели плода
- Повышается риск преэклампсии (тяжелого осложнения беременности)



## К пациентам с высоким риском тяжелого течения COVID-19 относятся:

- Пациентки с сопутствующей соматической патологией, в том числе, сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистая патология, хронические заболевания печени и почек, онкологические заболевания иммуносупрессия, трансплантация органов, гемодиализ и др.



## Вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) при беременности

- Не выявлено отрицательного влияния вакцины на течение беременности, состояние плода и ребенка
- Применяется во время беременности и грудного вскармливания
- Не может быть источником инфицирования человека
- Целесообразно проведение вакцинации с 22 недель беременности



## У вас высокий риск инфицирования COVID-19 если:

- Вы или кто-то из вашей семьи является социальным или медицинским работником
- В месте вашего проживания высокий уровень заболеваемости COVID-19
- Вы или члены вашей семьи часто бываете в местах массового скопления людей (общественный транспорт, магазины, культурно-массовые организации и др.)

